

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百九十五

詳校官太醫院使臣張聲基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十五

明

周王朱橚撰

嬰孩吐瀉門

冷吐

附論

冷吐者由乳母當風取涼解脫致令風冷之氣入於乳
令乳變敗兒若飲之則冷氣入胃故成嘔吐其青涎夾
妳吐出是也治之當令乳母捻去舊宿敗乳然後服藥

用醞乳法以療之

楊氏云乳母服香蘇散夫和藿香正氣散薑棗煎服逐去寒邪次服理中

湯加丁香木香煎
服以溫養乳母

方

聖石丹治小兒胃氣不和乳哺重沓及食入不消或呼
吸風冷即令嘔吐若不止最為大病胃氣虛嘔吐久

差神驗

真陽起石

半夏

洗七次焙
各半兩

人參

去蘆

不灰木

炭灰
洗一

伏時
二兩

杏仁

同巴
豆製

巴豆

各一七
燈上煉

為度研末

同連皮

阿魏

研一

錢

木香

白茯苓

母丁香

各一兩

礞石

炭灰燒一
伏時四兩

右先將八味搗羅為末次用杏仁巴豆阿魏研末同入湯泡炊餅和丸如龍眼大每服一粒水一盞入生薑一皂子大同擘碎煎五分溫服須於銀器中煎藥石器亦得

治胃寒嘔吐方

金液丹 青州白丸子

右合和為末麪糊再丸如米大米湯送下仍服助胃膏

助胃膏治小兒冷氣入胃嘔吐不已

人參

去蘆

白朮

白茯苓

甘草

炙各半兩

砂仁

四十箇

白

豆蔻

十四箇

木香

三錢炮

丁香

半兩

乾山藥

一兩

肉豆蔻

四十箇

炮

右為末煉蜜丸如芡實大米湯下一歲服一九

一方加藿

香陳皮

丁香丸治小兒胃虛寒腹疼吐逆

丁香

木香

藿香

牛黃

各半兩

腦麝

二錢

膩粉

少許

右為末麪糊九小豆大熱湯化一九服之

金鍼九治小兒冷氣吐逆不止心胃痞滿

陽起石

杏仁

十五枚湯浸去皮尖雙仁炒

不灰木

生研

阿魏

錢巴豆

半去皮膜十二枚

右除巴豆杏仁別研外為末後入二味再研勻以糯米飲九如雞頭仁大焙乾每服一九同鍼穿燈焰上燎透為度入鹽少許研細冷薑湯調下量大小加減
以意

溫脾散散寒濕治嘔吐

厚朴

去皮塗薑汁炙香熟一兩

丁香

白朮

乾薑

各半兩

肉桂

一分

右為末每服一錢煎人參湯調下

中結丸治脾胃冷吐逆水食不下噎妳此因乳母多食

酒肉淹藏毒物得之

禹餘糧

火煨赤米醋滓半兩

巴豆

麩裏煨七粒

朱砂

皂子大

定粉

炒二

錢

麝香

少許

右為末蒸餅為丸如菉豆大每服三五丸遠志湯下
流星散治小兒胃氣虛冷痰吐嘔逆

半夏

十四箇大者生用

胡椒

四十粒

右為麤末每服半錢水一盞入生薑一分油七滴煎
至四分去滓溫服

橘皮湯治小兒嘔吐膈上有冷

陳橘皮

湯浸去白焙

細辛

去苗葉

乾薑

炮製各二分

大黃

剉炒

甘草

各三分

右麤搗篩每服一錢水七分盞煎至四分去滓溫服
分三服一日令盡更量兒大小以意加減

瑞蓮散治脾胃一切虛寒嘔吐不食並皆治之

石蓮肉

一兩

木香

丁香

各二錢半

人參

三錢

澤瀉

三錢

訶子

肉
一箇紫蘇子

炒牛兩

肉豆蔻

二箇煨

白芷

牛兩

陳皮

牛兩

右為末每服一錢薑棗湯下

熱吐

附論

夫小兒熱盛患極熱而吐更下熱藥脾胃熱而胃口閉

所以吐傷水穀不通九下湯藥乳食只伏在管胃口不開脾伏乳食上下不動若下取藥胃口不開只在胸膈不上不下乃是結腸翻吐候也

歌曰得患初因是熱傷熱極吐逆也尋常誤人

最是庸醫見熱病仍將熱藥嘗致令胃閉并腸結莫服冷藥不煩涼若還更取兒當死先宜開胃後通腸

方

辰砂丸治胃熱吐逆不止及驚風涎盛潮作

辰砂

別研

水銀砂子

各一兩

牛黃

別研

腦麝

半錢

生犀

去節

末

天麻

白僵蠶

酒炒

蟬殼

去毒

土乾蝎

去毒

麻黃

去節

天南星

湯浸七次切了
焙乾稱各一分

右為末再研勻熱蜜九如菰豆大朱砂為衣每服三
九或五七九食後煎薄荷湯送下

保命膏治吐逆不定服熱藥過多不能瘥者

丁香

山大戟

大黃

炮

不灰木

燒紅
放冷

甘遂

各一
分已

上俱為
細末

朱砂

細研

水磨雄黃

細研水飛
各半兩

粉霜

水銀

用結錫砂子
各一錢重

巴豆

去皮心膜不出
油研細十箇

右都研勻用黃臘四兩銀石器中鎔攪成膏旋取和

九如黍米大每服未周歲一粒二三歲兩粒四五歲
三粒六七歲五粒十歲已上七粒用新汲水下

清膈飲治小兒伏暑嘔吐者最宜服之

淡竹葉

去枝梗剪
葉焙令乾

香薷

各一
兩

檀香

人參

去蘆
頭

半

夏

湯洗
七遍

白茯苓

甘草

炙各
半兩

白粳米

一
合

右為粗末每服一錢水一大盞煎至六分去滓溫服
量兒大小以意加減一方薑棗煎

益胃湯治胃虛挾熱嘔吐不止

丁香

人參

去蘆頭
各一兩

訶藜勒皮

一分官桂

大黃

黑炮

黃各
十兩

右為細末每服一錢水一小盞入生薑二片煎至五

分去滓服溫下

妙聖散治小兒胃熱吐逆

龍腦

粉霜

膩粉

滑石

各等分

右研為細末麪糊為丸如菽豆大每服一九煎乾柿

湯下不拘時候

麥門冬散治小兒嘔吐心胃煩熱

麥門冬

去心焙

甘草

炙微赤剉

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白瓢焙各一

分

右為散入淡竹茹茺根各一分剉碎每服一錢水一小盞入生薑少許煎至五分去滓稍熱頻服量兒小大以意加減

香茹散治小兒熱吐秋夏多伏暑出有黃涎頭額溫至心熱小便赤澀或乾嘔無物霍亂吐瀉轉筋腹痛宜

服此乳母同之又宜服甘露飲

香薷

一兩厚朴

製

白扁豆

各半兩

右先用薑汁四兩杵厚朴令細炒令黃赤色入香薷扁豆二味都為末每服五錢水一盞酒一盞共煎去滓入麤瓶內蠟紙封沉入井中候極冷取出一餅服加減兒母同

甘露飲治證同前

方見本門霍亂吐利類一名玉露散

蘆根粥治小兒嘔吐煩熱渴

生蘆根

剉二兩

粟米

一合一方
作糯米

右以水二大盞煎至一盞去滓投米作粥入生薑蜜
汁少許服

甜消散治小兒風熱吐不止

甜消

一錢

滑石

白膩者
半兩

右為散每服半錢用漿水半盞入生油一點打勻調
下極者三服必定兒大者每服一錢忌生魚菓實

治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方

以葛粉二大錢水合調勻瀉鉢鐸中傾側令偏重湯中煮令熟以米湯相和令下之

清胃散治小兒熱吐

用生薑薄切以生麪拌曬乾各焙為末以紫蘇湯調下

治熱吐兼痢方

用敗毒散五苓散陳米煎服 夏秋吐痢多是母感冒暑毒必脉虛面垢自汗身熱惡寒煩渴證治與此

熱吐或痢同

夾驚吐

附論

小兒吐乳早晚發熱則是驚吐而不睡是也此由胃氣實其乳或氣不定或食交乳或怒未息或成房事因以乳兒致劃然便吐吐出乳若不變色無害若色青黃或如水或其中有蟲者治須涼膈以溫物煖其腦後避惡風吹其風府也既生其氣又涼其上焦吐即止也更宜與調劑以療之

歌曰吐乳從來胃氣實乳滿胃中生吐逆吐多遍身有風熱驚邪本是從斯得

治法無過溫腦後吐乳須教莫變色
先與定氣後除驚如此醫流無費力

方

歸命丹治夾驚吐嘔不止

丁香 藿香

各一分

生犀

牛黃

各半錢

猪膽

狗膽

蝟膽

熊膽

鯽魚膽

各等分共稱取半兩

右末和丸如菉豆大量兒大小加減一歲以下煎苦
棟湯研下二九已殊聖方歌曰小驚膈滿吐還頻晝夜
連連不暫停綠水槐黃泔涎汁虵蟲乳食一時噴藿香

研共生犀角五膽牛黃立有驗若有得逢如此藥直饒
命困却還魂

三香丹治夾驚嘔吐不定

藿香葉

丁香

各一兩

半夏

湯洗七遍焙乾半兩已上並為細末用

膩

粉

各一分

龍腦

麝香

當門子各一錢

右同拌勻取生薑汁打麪糊和丸如黍米大每服十
粒入人參薄荷湯量兒大小加減

人參溫中湯治小兒驚吐熱吐心神悶亂中脘不和漸

加恐悸恍惚無定

人參 白朮 白茯苓 半夏湯浸七次 陳皮 肉豆

菟煨各等分

右為細末蒸棗肉為丸如麻子大朱砂為衣藿香生薑湯下三五十丸不拘時候多服勿慮

藿香湯治驚吐并吐

藿香三兩 白扁豆薑製 厚朴薑製 白茯苓各兩半 甘草炙一兩

右剉酒水煎子母同服

定吐丸治小兒驚食胃脘不快吐逆乳或心胃發熱

丁香

二十一枚為末

蝎稍

四十條

半夏

三箇洗焙乾為末

右研勻煮棗肉丸如黍米大每服七丸至十九金銀湯吞下如傷暑霍亂吐瀉煎藿香散送下

睡驚丸治熱化痰涎鎮心神止驚悸吐逆

半夏

薑製末

乳香

末

犀角

末各一錢

右以生薑自然汁煮麪糊為丸如菉豆大每服七粒至十粒薄荷水夜卧服

四季散治久患翻胃及驚吐諸吐

上好硫黃

半兩
細研

水銀

同硫黃再研
無星一分

生薑

四兩
取汁

右同研如黑煤色每服三錢入薑汁并酒一盞同煎熟調藥空心服用衣被蓋覆半日汗出即瘥有人患翻胃三年不瘥治療百端無驗四季者持此藥與服汗出如膠腥穢不可近後更不復吐其神效如此又須量兒大小服一錢至一字冷水調下此藥難調須先滴水少許以指緩研殺稍稍增湯始令調和若入

湯酒則浮泛不可服矣一方無生薑

毒氣吐

附論

小兒服湯中毒氣吐下候春夏以湯下蓋由腸胃脆嫩不勝藥勢遂吐下不止藥勢熏臟腑乃煩懊煩之者謂此為中毒毒氣吐也

方

藿香湯治小兒毒氣吐下腹脹逆害乳哺

藿香

兩生薑

兩

青竹茹

甘草

炙各半兩

右㕮咀以水二升煮取八合每服一合日三有熱加
升麻半兩

消妳毒方令小兒喫妳無毒

升麻

劉半兩

大麻子

搗破一合

右酒浸每早晨與妳一盞喫了要乳時須捻去些少
方與兒喫并兒有毒亦解

吐痢

附論

夫吐痢者由腸虛而氣逆故也小兒有解脫而風冷入

腸胃虛則泄痢胃氣逆則嘔吐此大體與霍亂相似而
小輕不劇悶煩故直云吐痢不呼為霍亂也歌曰小兒
吐痢早須
醫只為腸虛逆氣為更有中
他湯藥毒必加煩躁在心脾

方

掌胃膏治小兒脾胃虛弱嘔吐泄痢

人參 白朮

白茯苓

去黑皮

甘草

炙

肉豆蔻

麩去

麩

白豆蔻

陳皮

草豆蔻

去皮

枇杷葉

去毛

青皮

白

丁香 沉香

木香

藿香葉

縮砂葉

各等分

右為末煉蜜九如龍眼大每一丸食前米湯化下日

二

助胃膏治小兒胃氣虛弱乳食不進腹脇脹滿腸鳴泄

嘔乳便青或時夜啼胎寒腹痛

官桂

去皮

白茯苓

去皮

白朮

藿香葉

縮砂仁

各三兩

白豆蔻仁

肉豆蔻

煨

木香

各一兩

丁香

一兩

甘草

炙剉

二橘紅

去白

山藥

各四兩

人參

一兩

右為細末煉蜜和膏九如雞頭大每服一丸量兒大

小加減米飲化下不拘時候

麥苓散治吐瀉

人參 白茯苓 山藥 乾葛 麥門冬去心 黑附

子炮去皮臍 桔梗去蘆 甘草炙各半兩 蓮子心 木香不見火各一錢

藿香葉一分

右為末每服一錢紫蘇米飲調下

醒脾散

人參五錢 丁香一錢 赤茯苓五錢 藿香葉五錢 白朮五錢 白

薑二錢 甘草三錢 木香二錢 厚朴薑製 天南星大者二箇

縮砂仁一兩同南星炒

右剉薑棗煎燒鹽服

醒脾湯治小兒吐瀉脾虛多困不思乳食欲生風候

人參 白茯苓 白朮 山藥 白扁豆炒 白附

子 藿香 白殭蠶 甘草 升麻 酸棗仁各等

分

右為末三歲一錢冬瓜子三七粒水半盞煎至三分

去滓服二劑消風散最治吐瀉生風多困加硃麝
香朴飲子治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂如發驚狀

人參 茯苓 甘草 紫蘇葉 木瓜 澤瀉

香薷 半夏麴 白扁豆 炒 陳皮 烏梅肉 厚

朴 炒各
四錢

右為末每服一錢薑棗煎服

治小兒直腸泄瀉水穀不分小便不利口乾作渴

人參 白朮 白茯苓 木香 訶子 麴裏
炮 砂仁

陳皮

炒

瞿麥

炒

車前子

麥門冬

去心各等分

甘草

減半

用

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分量兒大小無時服

小兒青糞者冷也亦是肝尅脾之證也肝屬木其色青脾屬土其色黃糞黃者脾家之本色也若脾受肝尅則其糞青肝木主風宜早治之不爾成脾風發癇也然所謂青糞纔下便青若初下時黃良久乃青小兒安樂

者皆然不可認為青糞也可服白附子九羌活膏

白附子九治小兒青糞及吐而有冷證者

白附子

一分

為末船上硫黃

半夏

半兩生為細末用自然汁和成劑藥

作小錢大餅子沸生薑湯內下候煮熟不麻人為度取研成膏

右加蝎稍末一分同研勻入在半夏膏內和冷得所
下

乾即添湯九蘿蔔子大每服三十五粒米湯或乳汁

羌活膏治小兒胃虛吐瀉生風

羌活 天麻 防風各半兩 人參 茯苓 蝎酥炒 桂

各一錢
兩 朱砂一錢 水銀一錢 硫黃一錢
研 水銀研

右先將八味為末入水銀硫黃研勻煉蜜為膏每服
一皂子大用荊芥薄荷湯化下食前服更量度加減
醒脾散治小兒吐瀉脾困不食痰作驚風

全蝎焙半錢 白附子炮 天麻焙 甘草炙 人參炙 白茯苓

苓 石菖蒲細節 木香 蓮肉去心 白朮各一錢

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗一箇煎服有

熱者去木香一味加南星半夏陳米

大醒脾散治證同前如兒不肯服藥令乳母服後即仰

卧片時乳兒

南星 白茯苓 橘紅各二錢半 全蝎炒 甘草炙 白附

子炮蓮肉去心人參 木香各一錢二分半 陳米二百粒

右為末每服一錢水一小盞薑三片棗一箇煎服

木香散治諸般瀉痢久不瘥者並皆治之

白木麴炒麥芽 木香 人參 陳紅麴各一錢同炒

茯苓 神麴 甘草 青皮 各二錢 當歸 一錢

右為末每服半錢白湯下一方用紫蘇木瓜湯調下
加減觀音散治小兒食瀉及調理脾胃宜常服之

白扁豆 蒸白朮 炒人參 白茯苓 乾山藥 黃

耆 密水 甘草 神麴 麥蘖 香附子 沙去毛 各等分

右為末空心米湯調下此藥宜常服取後復補

調中散治脾胃不和霍亂吐瀉

人參 白茯苓 白朮 木香 炮乾薑 炮藿香葉

香附子

炒去毛

縮砂仁

甘草

炙

丁香

不焙各等分

右為末薑棗煎大小以意加減或肚疼急白湯調下
參朮散治小兒吐瀉亡失津液煩渴心躁不食多服尤

妙

人參 白朮 白茯苓 山藥 白扁豆

炒乾葛

藿香 甘草

炙

丁香

訶子

炮去核各一分

右為末三歲一錢水半盞生薑二片煎三分食前如
渴速進三五服

羌活膏治小兒吐痢不止煩渴悶亂欲成脾風手足微搐但非次發熱不能辨認證候請於一時中併服隨手有應冬末春初最宜頻

羌活

獨活

各去蘆頭

人參

白茯苓

去皮切

天麻

炙

乾

蝎

青黛

研一分

腦麝

各半錢研

水銀

硫黃

各一錢結沙

子

右為末研勻煉蜜九皂子大捻作餅子五七歲每服三餅三三歲二餅一歲半餅一餅如發熱煎荊芥湯下或乳香湯手足厥冷人參生薑湯下舊方有香而

無龍腦青黛此方去三物亦不曾入丁香三二歲兒
每服祇一餅恐大寒也若吐甚丁香湯化下亦佳
一方治小兒因驚發熱涎嗽累經痢動或因傷乳食吐
瀉後氣虛弱精神昏倦減乳食手足厥冷脉息微細漸
成慢驚用藥普同

羌活膏治小兒伏熱吐瀉不定煩渴肚疼

羌活 獨活 人參 防風 肉桂

去皮不見火

硫黃

三錢 白茯苓

全蝎

各一分

水銀

一分同硫黃研無星

右為末煉蜜丸如雞頭大三歲一九食前薄荷湯化

下

和安散治冷熱不調瀉盛下泄

木香 當歸 川芎 北前胡 柴胡 青皮

桔梗 甘草

炙

赤茯苓

各等分

右剉散每服一錢水一盞生薑二片棗二枚煎空心服

觀音散治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳

食久則漸漸羸弱此藥主溫養脾胃進美飲食

人參

一錢半

茯苓

神麴

石蓮肉

炒去心 綿耆

白芷

木香

炮

甘草

炙

白扁豆

去皮炙焦令色黃
去火毒各一錢

右為末每服一錢水一小盞棗一枚藿香三葉煎四分去滓溫服量兒大小加減一方無藿香煎一方加麥蘖香附子各炒二錢大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已遂成風癰之證矣

和中散治胃氣止吐瀉

茯苓 石蓮肉 各一分 藿香 人參 天麻 白扁

豆 製 木香 白朮 甘草 炒各半分

右剉散每服三字水煎服

和中散治吐瀉止煩渴腹痛和胃氣

人參 切去鬚焙 白茯苓 白朮 甘草 剉炒 乾葛 剉黃耆

切焙 白扁豆 藿香

右為末每服二錢水一盞棗二枚薑五片煎至八分
去滓溫服之一方無乾葛名加減四君子湯每服一

錢鹽點服

玉桂杖丸治小兒吐瀉胃虛腹脹脾困昏睡不食

茯苓

訶子

去核

藿香

丁香

各一錢半

人參

木香

甘草

炒各半兩

厚朴

薑製一兩

右為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一九白湯化下
食前

大安丸治小兒吐瀉不止

南木香

白芍藥

人參

白朮

各一錢

白茯苓

訶子

炮

厚朴

製

橘紅

各半錢

右為細末蜜丸如雞頭大陳米飲湯化下一二九

厚朴散治小兒虛滑瀉痢不止

厚朴

訶子皮

各半兩

史君子

一箇

揀丁香

十箇

吳白朮

茯苓

青皮

各二錢

甘草

二寸炒

右為末每服一字量兒歲加減用清米湯下

訶子湯止瀉及治臟寒泄瀉

訶子

炮肉

人參

白茯苓

白朮

各一兩

木香

炮兩

陳

皮去白甘草炙半兩豆蔻半兩

右為末薑煎若久瀉手足厥冷加附子大小加減服之

人參散治小兒臟寒泄瀉

人參 木香炮 白朮 白茯苓各一錢 山藥一分 肉豆

蔻一箇 附子尖一錢 甘草半錢

右為末薑棗煎量兒大小加減服之

妙九子治小兒吐瀉并傷食腹疼不思乳食兼吐乳

丁香 藿香葉 木香 白茯苓 官桂

去皮青礞

石

代赭

錢各一

巴豆

二七粒大者去皮心膜紙上壓去油

右為末酒糊丸如芥子大一歲二九薑湯下或藿香湯食前不得喫物須權住乳効恐乳多再吐如傷食瀉與五七丸利下食次與益中膏

木香散治小兒脾胃虛弱瀉泄飲食不進

木香 藿香葉 青皮

去白

甘松

丁皮

香附子

益智仁

各半兩

縮砂仁

一兩

薑黃

一錢

右為末甘草末一兩每服一錢紫蘇湯調下食前大人用每服三錢

濟世膏治小兒吐瀉并百物所傷驚疳潮熱

木香

五靈脂

錢一

肉豆蔻

二箇

胡椒

錢一

丁香

錢一

全蝎

二錢巴豆

四粒去油存性

硃砂

半錢為衣

右為末糊丸如蘿蔔子大每服二三十丸米湯下

訶黎勒散治小兒脾胃氣弱不欲乳食四肢不和吐痢

不止者

訶藜勒皮

陳皮

去白各半兩

黃耆

去蘆頭

藿香葉

赤

茯苓

白朮

桂心

甘草

右為粗散每服一錢水一小盞入生薑少許棗一枚

同煎至五分去滓食前溫服

感應丸治小兒脾虛累有暴傷糞白腫臭水穀不分肚

腹疼痛吐瀉不定

百草霜

二錢

杏仁

七箇去皮尖

丁香

七粒

肉豆蔻

一箇

木香

一塊

如棗大

乾薑

炮一塊如棗大

巴豆

七粒去油

蠟

二棗大酒煮蠟酒冷蠟泛於上

取

用

右為末酒蠟搗三二千下成劑入磁器中每服三歲
五九小豆大乾薑湯下食前此藥不損氣亦不吐
瀉只磨積滯

碧香丹治小兒吐痢後大渴不止得眠睡甚則成疳

天竺黃

不灰木

燒赤
放冷

赤石脂

龍骨

各一兩

鐵粉

定粉

鉛白霜

蛤粉

各一兩
細研

右為細末以先四味後入霜粉四味更加麝半兩研

滴水和丸如雞頭大每服一九至二九用蛇螺兩箇研細沸湯浸水沉極冷化下大渴即令服神驗

治秋深腹虛吐痢無時喫食微細面目黃腫方

胡黃連 丁香 馬牙硝 蜜陀僧

各一分

訶子

五分

豆蔻

二箇 檳榔一箇 麝少許

右為末用蒸餅酒浸為丸如菉豆大每服三九陳米飲下日三服五歲五九止吐用楠木湯下止瀉用菉豆湯下

醒脾散治小兒吐瀉脾困多睡不思飲食

人參 木香 茯苓 陳皮 甘草 草豆蔻皮

厚朴 用銅砂一錢膽水一碗入此二味
煮冷乾切細却焙已上各一分 白木 半

右為細末每服一錢以冬瓜子煎湯下

勻胃散治三焦不調停寒膈上乳哺不消胃膈痞滿甚
則喘逆吐痢肌體痿黃

甘草 一分 藿香葉 兩 白豆蔻 兩 人參 去蘆頭一兩
一方各半兩

木香 炮半兩一錢 乾薑 炮半兩一錢 厚朴 去粗皮薑製
方用一錢 半兩一方用

錢一丁香半兩

右為細末每服一錢水一小盞入生薑二片煎至六分去滓溫服一方為末薑棗鹽湯或紫木瓜湯點服

煎治霍亂

草豆蔻散治小兒吐痢兼胃脇脹滿

草豆蔻去皮木香 五味子 人參去蘆頭 白茯苓

陳橘皮湯浸去白瓢焙各一兩 訶黎勒皮 甘草炙微赤剉各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時

候稍熱服隨兒大小以意加減

訶梨勒皮散治小兒吐痢腹脇虛滿

桂心

分一

訶黎勒皮

人參

去蘆頭

甘草

炙微赤剉

白朮

厚朴

去粗塗生薑汁炙令香熟

陳橘皮

湯浸去白瓤焙已上各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時

候稍熱服之量兒大小加減

增減神妙方治小兒下痢及吐瀉驚

大黃

二分

釣藤

六分

黃耆

細辛

半分

蛇蛻

一寸炙

蚱蟬

二箇

炙甘草 一分

炙

右切以水一升半煮五合絞去滓研牛黃五大豆許入湯中一服一棗許日三夜更用艾灸兩耳前三炷必瘥無牛黃麝香代之十日以來止吐以意量之二十日即可全愈

人參異功散治小兒瀉痢止吐逆順氣補虛

人參 一錢 白朮 半兩 青橘皮 陳橘皮 茯苓 甘

草 各一分 豆蔻 三箇入
分 柯子

右為末每服一錢陳米飲調下如秋間合則加訶子
春夏不用或用紫蘇木瓜煎七沸半盞末半錢或加
至一錢逐日早服如傷風及諸般傷寒此藥亦能和
正氣候然後以紅綿散治之無不効者

醒脾散治小兒吐瀉脾困及脾胃怯弱為風冷所乘體
熱頭疼霍亂

人參

錢二

丁香

二十粒

白茯苓

白朮

各一分

藿香

甘

草

炙各一錢

天南星

一箇七八錢重去心用縮砂仁研入在天南星內麴裏煨熟麴焦為

度去麩
不用

右為細末每服一錢水六分生薑三片冬瓜子十四粒同煎三分溫服不拘時

紫霜丸治小兒吐瀉

代赭石

陳皮

去白巴豆半錢重
同炒乾巴豆去油

木香

杏仁

去皮

尖研各
一錢

肉桂

去皮不
見火

丁香

各半
錢

藿香葉

二錢

右為細末粟米飯為丸小菴豆大每服七粒藿香湯下吐瀉炙藿香橘皮湯下吐煎棗子湯下

溫脾散治吐痢不進乳食

蒼朮

二錢細剉先以油蔥炒令赤

陳皮

草果子

不炮去皮用

桂心

不見火 桔梗

甘草

炙各一錢

右為末每半錢棗湯調下

銀白散治小兒胃氣不和吐瀉不止痰逆不進奶食平

胃引行諸藥

半夏

一兩湯洗七次焙乾為末薑汁製為餅子

白扁豆

微炒

罌粟子

人

參

去蘆頭

白朮

炒剉

山藥

白茯苓

各四錢

右為末每服二錢水八分盞生薑二片棗一枚煎至六分溫服

桑葉膏治小兒伏熱吐瀉渴腹疼肢冷

水銀

硫黃

各一錢
同研黑

丁香

槐花

蜜炙
炒

藿香葉

蠟茶

各一錢

滑石

三錢

右為末煉蜜和丸如雞頭大三歲一九煎桑葉湯食前化下

平胃散治小兒伏熱吐瀉煩渴腹冷疼

水銀

硫黃

各一錢
同研黑

訶子

炮去
核

肉豆蔻

炮

桂皮

草豆蔻

去
皮

附子

炮去
皮臍尖
已上各一錢

右為末煉蜜丸如雞頭大三歲一九米湯調下食前

服

消食丸治小兒吐瀉不定傷食腹痛可食亦治瀉利

丁香皮

縮砂

甘草

甘松

蓬朮

益智

各一

兩

香附子

二兩一方加
神麴麥藥

右為末糊丸小豆大三歲三十九米湯下

益中膏治小兒吐瀉脾虛全不食腹脹肚疼困倦

丁香

二錢

縮砂

一錢

訶子

炮去核

甘草

半兩

青橘皮

半兩炒

陳皮

一兩炒

肉豆蔻

二錢炒

右為末煉蜜丸如雞頭大三歲一九白湯磨下肚腹脹不思飲食大便穀米不化夜起者連進三服立効人參膏治小兒吐瀉脾虛困倦不思乳食腹痛滿加沉香

人參

訶子

炮去核

木香

肉豆蔻

丁香

藿香

縮砂

甘草

炙各一錢

右為末煉蜜丸如雞頭大三歲一九白湯下食前空心服

白朮散治暑瀉身熱發渴不問陰陽虛實並宜服

白朮

一兩本用半兩今增

人參

一兩本用兩炮半

白茯苓

甘草

炙半兩

藿香葉

半兩

葛根

一兩本用兩今減半

右以咀水煎冷服一方無木香一方以咀每服二錢

水一盞煎至半盞量大小與服仍用香連丸間之渴

欲飲水者時時煎服取意飲之彌多彌好 一方白

朮散治嘔吐用白朮人參各一兩半夏兩半茯苓乾薑甘草各半兩薑棗煎錢氏方謂小兒吐瀉當溫補之每用理中湯以溫其中五苓散以導其逆連進數服兼用四君子湯加橘紅等分調之名異功散

若吐瀉之後已覺虛損若因虛發熱必作慢風急用金液丹雜青州白丸子等分為末米飲調服此藥多服為佳若胃氣已生則旋減金液却以異功散等藥

徐調理 不因吐瀉後忽因驚發搐搦者名急驚風
則服大青膏奪命丹等 有因傷食并傷風發熱驚
跳搐搦如風者是瘡疹之候宜服參蘇丸仍於惺惺
散方求之 若食不化脾胃虛寒嘔吐惡心者當服
益黃散用陳皮半兩青皮訶子肉甘草各一分丁香
一錢量大小煎服 小兒暑月吐瀉其證不一 有
伏暑小便必不利宜服五苓散有傷食者其吐并糞
必酸臭氣宜服紫霜丸 有因驚者泄瀉其色必青

宜服睡驚丸

有虛冷者泄瀉無度或復澹利宜以

六神湯加附子服之用人參茯苓山藥白朮白扁豆
甘草等分薑煎服風證於六神湯中加天麻痢加罌
粟殼熱痢當用斷下湯中治法 若吐瀉初定當單
以天南星為細末每服用冬瓜子仁七粒煎服以防
變癰有霍亂吐瀉諸藥不納者用胡椒綠豆各十九
粒研破水煎服 小兒之病與大人無異用藥一同
但當量力服之唯回氣臍風夜啼重舌變蒸客忤驚

痢解顛鬼病瘡氣不行數大人無之自有專科不敢
濫及 海藏云四君子湯加減治法濕勝氣脫泄痢
大過

木香丸治小兒泄瀉不止進食和氣

方見本門噦逆類
一名木香豆蔻丸

豆蔻丸治痘疹泄

木香

縮砂仁

各二錢

白龍骨

訶子肉

各半兩

赤石

脂

枯白礬

各七錢半

肉豆蔻

半兩

右為末麪糊丸如黍米大每服三十丸至五十丸煎

異功散下或瀉水穀白色淡黃木香散下

雞舌香散治小兒吐瀉

良薑

香附子

天台烏藥

辣桂

各二錢

甘草

微炙

陳皮

藿香

各一錢

右為細剉每服一錢水煎灌下仍別煎與乳母服

沉香散生胃氣止吐瀉

茯苓

二錢

沉香

丁香

木香

藿香

川厚朴

製

甘草

各一錢

右為末每服一字米飲調下

惺惺散治小兒吐瀉脾困內虛

人參 茯苓 木香 天麻 白扁豆 陳皮炒

全蝎

焙各等分

右為末每服半錢薑棗畧煎服

助胃丹治小兒泄注不止手足厥冷及霍亂吐痢

附子

一枚重半兩
炮製去皮臍

舶上硫黃 乾薑 肉豆蔻

肉桂

白朮

各半兩

右為細末麴糊丸如黍子大每服十九米飲下食前服

木香益黃散治胃虛腹痛泄痢

陳皮

一兩青皮

訶子肉

微炒各一兩

丁香

二錢

木香

甘

草

炙各錢半

右為細末每服一錢陳米少許水煎服

六神散治吐瀉胃氣不和進飲食

人參

半兩

甘草

二錢

山藥

半兩

白茯苓

白扁豆

炒各一兩

白

木
半兩

右為末每服一錢薑棗煎服吐瀉後發搐加天麻更
瀉不止加白豆蔻治吐逆瀉痢入藿香陳皮少許同煎
湯風即入香白芷桔梗渴即加乾葛小兒加減服
固腸丸治小兒脾胃不和腸滑泄瀉

木香 肉豆蔻
麝裏煨以麝
熱為度去麝 縮砂仁 赤石脂

厚朴

薑川薑各等
分製

右為細末麝糊丸如黍米大每服三十九至五十九

乳食前煎草節湯下

香橘餅子治食瀉

木香

一分

青皮

一分

陳皮

一分

厚朴

三分

神麴

半兩

麥藥

半兩

右為末煉蜜丸如芡實大煎石香薷湯化下一歲一

丸

嬰房散治小兒久新吐瀉不思乳食或成白痢

嬰粟殼

一兩

陳皮

一兩

訶子

一兩

炮

縮砂仁

甘

草炙二錢

右為末三歲半錢米飲下食前

沉香散治小兒吐瀉不思乳食腹滿

沉香

丁香

各半兩

木香

藿香葉

甘草

炒

縮砂

仁

各一兩

右為末三歲半錢紫蘇木瓜湯調下食前

人參散治小兒吐瀉煩渴不止兼虛熱踈轉後可服

人參

茯苓

桔梗

乾薑

各半兩

生犀角

屑

甘草

炙各
一分

右為末每服一錢水一盞入燈心五莖煎至五分煩

渴入新竹葉煎服大小以意加減

一名犀角
人參散

人參

去蘆
頭

白朮

炮

丁香

各一
兩

乾薑

甘草

炙

赤茯苓

苓

各半
兩

右為末煉蜜丸如皂子大每服一粒熱湯化開新水
或冷沉令極冷即服

木香散治小兒腹脹瀉渴此藥性溫平和表裏通津

液清上實下扶助陰陽

木香 丁香 官桂 人參 大腹皮

炒一用子

陳皮

訶子肉 前胡 半夏

製薑汁浸

甘草

茯苓

各等分

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎六分稍熱服量
大小加減服之

調中六神散治小兒或吐或瀉脾困不進乳食或驚風
傷風潮熱或喘後出汗

白朮 茯苓 甘草 藿香葉 草果子

各一分

丁香

香二錢

右為細末每服一錢紫蘇米湯煎下兼治氣不勻疳

瀉痢妙

沉香飲子大治吐瀉

沉香

丁香

藿香

各半錢一方用一分

檳榔

二箇一方用一箇

肉

豆蔻

二箇

甘草

炙一錢一方用一分

右為末每服一大錢水一小盞入老薑一小指大槌

碎同煎三兩沸去滓溫服

人參散治脾胃氣虛吐瀉

人參 白茯苓 白朮 乾葛 陳橘皮 厚朴

去瓢

薑汁塗炙
各等分

右為末每服半錢用百沸湯點量大小服之

人參散治小兒吐痢發熱不欲乳食

人參 半兩去蘆頭 乾薑 製炮 桂心 各一分一方用各三分 甘草

草 一分炙微赤剉 黃芩 二分一方用各四兩 用六分

右為散每服一錢水一小盞棗一枚煎至五分去滓

不拘時稍熱服量大小加減

白朮散治小兒冷熱不和吐痢不止

白朮 木香 丁香 陳橘皮

湯浸去瓢
焙各一分

麥門冬

三分去
心焙

右為散每服一錢水一盞煎至五分去滓不拘時稍
熱服量兒大小以意加減

丁香散治小兒吐瀉

丁香 二七
粒 肉豆蔻 一
箇 木香 藿香 桂心 各半
錢

右先將前三味研用醋麴裏熟灰煨令麴赤色去麴不用次同藿香桂心為末每服一字或半錢用陳米飲煮飲調下

醋酒白丸子治小兒吐痢中寒并各忤

半夏

洗

人參

各三分

桔梗

附子

炮去皮臍去

乾薑

各四分

右為末以苦酒和丸如小豆大一服一九日三此一

歲服法

降靈丹治小兒非時吐瀉腹脹胸膈痞閉

一名朱復丹

舶上硫黃

雪白硝石

二味各一兩並於沙石銚內或銀器用文武火慢炒

鎔令作珠子無令火緊太過即不中須傾在紙上放冷取之研細末二味先將成末為妙須依法度

製

連花青皮

久年陳皮

上等無石五靈脂

各一

錢

右為細末麪糊丸如麻子大量兒大小加減大人丸如菟豆大每服十九空心食前溫米飲下此藥治陰陽不和冷熱相擊榮衛差錯上下隔塞心腎不升降水火不交養男女老幼一切危證並可救治但點胃

氣在服者無不獲安邪熱炎上煩躁及冷熱攻注急
痛諸霍亂吐瀉水穀湯藥不過一服即安吐逆唇口
青色手足厥冷脚轉筋兼着熱煩躁昏塞倒地不省
人事者兩服見效若吐瀉下痢不問赤白冷熱或非
時吐瀉氣痞食不下或一丸兩丸化破甚五十九輕
者二十九小兒十九十五丸嬰兒三丸五丸因驚成
癇發渴多日變成虛風或作慢驚者五七丸併服其
神聖救人隨時變動不能俱述

白朮散治小兒吐痢不止溫胃消食

白朮 木香 丁香 肉豆蔻 黃連

各等分

右為末麪糊丸如黃米大每服十九米飲下

雙金散治小兒吐瀉實脾胃進飲食

丁香 人參 甘草

各一錢

白朮

白茯苓

各半兩

半

夏

薑製半錢

右為末每服二錢水七分薑薑二片棗二枚同煎至

四分去滓溫服

厚朴散治小兒脾胃冷或吐或瀉

厚朴薑製 白朮各一兩 神麴炒 麥蘖炒各半兩 藿香 甘草

各一分

右為細末棗湯調下

開胃丸治小兒臟腑怯弱內受風冷腹痛脹滿鳴泄痢或青白乳食不化兼胎寒臟冷腹痛夜啼

白芍藥 麝香細研各一分 人參 木通 蓬朮煨 白

朮 當歸炒各半兩

右為末勻湯浸炊餅和丸如黍米大每服十五丸溫
米飲下新生兒每服五丸乳食前一方有木香無木
通

異功散治溫中和氣吐泄思食凡小兒虛冷病服之正
氣

人參 茯苓

去皮

白朮

甘草

炒

陳皮

各等分

右為末每服二錢薑五片棗二枚同煎至七分食前
溫服量多少與之海藏云四君補脾湯加減法一方

治榮衛脾胃弱加白扁豆等分陳米飲調下

木瓜丸治小兒吐瀉

木瓜

字一

麝香

木香

末

膩粉

檳榔

末各

一字

右同研麪糊丸如黃米大每服一二九甘草水下無時

人參膏治小兒泄瀉煩渴嘔逆

人參

一兩

白朮

半兩

丁香

半兩

藿香

半兩

白扁豆

一分

右為末蜜丸如菉豆大或麥粒大量大小加減生薑

湯下五七九至十九

厚朴膏治小兒吐瀉不思食

厚朴

製訶子

炮去核

肉豆蔻

炮

當歸

各半兩

甘草

炙一分

右為末鍊蜜丸雞頭大三歲一九白湯化下食前

益黃散治暑瀉身熱發渴及乳食失節肚痛腹大腸鳴

好食泥土吐瀉不止面青肌瘦或食乾嘔久病體黃

口中氣出吐酸水不能消食一切脾胃虛冷宜服此

藥

陳皮

去白
一兩

青皮

去白炒
半兩

訶子肉

炮半
兩

丁香

甘草

半兩

右為末三歲一錢半水半盞煎三分去滓食前加減
服本方陳皮一兩大陳氣若與甘草各減半方按古
今用藥不同用陳皮青皮加肉豆蔻累驗若依原方
內有青皮陳皮大偕及燥利其氣今故加減於方後
今又濟患庶得穩當亦不敢去其舊焉一方加木香
半兩

和胃丸治小兒吐瀉有痰不思飲食困頓欲生風

丁香

藿香葉

蝎尾

各一錢

白朮

切焙

半夏

炮七次各一兩

右為末薑汁糊丸如小豆大三歲三十九生薑湯服

乳肌服之

千金丸治小兒吐瀉腹痛不思飲食及傷食酸醜氣

神麴

炒

麥蘖

炒各一兩

烏梅肉

乾薑

炮

縮砂

去皮各半兩

右為末白麴為丸如小豆大三歲三十九米飲送下

食前

溫白丸治小兒脾氣虛困洩瀉瘦弱令疳洞痢因吐瀉
或久病後成慢驚身冷瘕瘕

天麻

白僵蠶

白附子

乾蝎

去毒

天南星

各一錢剉

湯浸上
次焙

右為末湯浸寒食麪丸棗豆大仍於寒食麪內養七日
取出每服五七丸至三二十九空心煎生薑米飲漸
加丸數多與服之

桂心湯治小兒痢下吐逆壯熱數日不止不得乳哺或

但羸因欲死者

甘草

炙

牡蠣

煨

芍藥

桂心

各三兩

右為粗末一歲兒水一升內四方寸七煮三合頓服
日再小兒以意加減此能除熱止痢上下神驗

溫白丸治小兒寒中吐痢及客忤

附子

炮

桔梗

各二分

人參

一分

乾薑

二分

右為末煉蜜丸二十日兒麻子大一九五十日兒胡
豆大一九百日兒小豆大一九米飲送下

藿香散治吐痢不止

藿香

一兩

丁香

一錢

木香

縮砂

各半兩

右為末每服半錢水五分煎三分通口服或續加陳皮甘草人參草果尤妙

附子湯治吐痢過多手足厥冷六脉沉細

生附子

白薑

炮

人參

甘草

炙各等分

右為剉薑棗冬瓜仁煎服

豆蔻散治吐瀉煩渴腹脹小便少

豆蔻

丁香

各半分

舶上硫黃

一分

桂府白滑石

三分

右為細末每服一字至半錢米飲調下無時

木附膏治小兒吐瀉不定氣粗煩渴眠慢困損肚疼不

食口鼻氣冷諸藥力不能攻者宜服此

附子

大者一箇炮去皮臍薑汁製浸夏三日春秋五日冬七日焙乾微炒黃色半兩

白朮

訶子

炮去核

甘草

炙各二錢半

右為末煉蜜丸如雞頭大三歲一九水半盞煎三分暑月冷服食前春秋冬溫服危者連進三服小可吐

瀉一服效須是首尾住如則可

附苓丸治小兒溏洩小便不利即加五苓散加附子

附子

炮去皮
半兩

白茯苓

澤瀉

滑石

各三錢

右為末白糊丸小豆大三歲二十九燈心湯下

金液散治小兒吐瀉危困四肢逆冷口鼻氣冷肚痛氣

急乳藥不進但多灌死中亦得活

硫黃

十分好者入罐
子至七分勿冷

水鑑草

一兩把節似花
田草一名田草

黃土

同搗為泥其用新
益母草泥搗亦得

石龍芮

兩把又名
狗啼草

右固濟藥罐子均厚半寸置平地以瓦覆口四面炭
五升擁定以熟火一斤自上然之候罐子九分赤口
縫有碧焰急退火以潤灰三斗覆至冷剖罐取藥去
沉底滓濁依前五煨為定藥如雞卵氣取出罐子埋
潤地一宿以水煮半日取藥以柳木搥碎研頻滴水
候無滓更研令乾每藥一兩以蒸餅兩浸捻乾同杵
如小豆大為丸三歲三十九米飲下食前危困連進
十服或為末多灌之尤妙或用生薑煎米飲調灌之

若手足煖陰退陽回即減金液丹二分增青州白丸
子二分研服

四君子湯治小兒吐瀉氣虛煩渴此藥生津液養五臟
多服妙

人參 白朮 茯苓 甘草

炒各一分

右為末三歲一錢水半盞煎三分食前服如久瀉手
足冷或服藥不痊以豆蔻水三分盞薑一片棗半枚
附子三片煎取一半五歲以上加藥末以意為之如

只瀉加肉豆蔻煨陳皮厚朴如渴則加麥門冬天花
粉熱則加地骨皮銀柴胡

殭腸散治小兒腸胃虛寒臟腑久冷泄瀉不止夏用暴
瀉尤宜

真鉛粉

半兩炒

白石脂

一錢

白礬

二錢焙

白龍骨

一錢

右為末每服半錢七老者一錢溫飮調下薄糊作
小丸多服尤效

木附湯治小兒臟腑虛寒泄瀉洞痢手足厥冷

附子

半箇炮了者

白朮

一分乾薑二錢

甘草

一錢炙

右咬咀每服一錢水一小盞煎至半盞去滓服手足
煖止之須是手足冷洞泄方可服

白朮散治小兒脾胃弱虛吐瀉

白朮

肉豆蔻

甘草

丁香

青皮

茯苓

各等

分

右為末每服一錢紫蘇湯下或用二錢水一盞生薑
二片烏梅半箇棗二枚蘇梗三寸煎溫服

和中散治小兒脾胃不和嘔逆惡心冷熱不調減食泄瀉腸痛腹鳴少力嗜卧

厚朴

去皮薑製六兩

白朮

三兩乾薑

炮二兩

甘草

炙二兩

右為末每服一錢水八分薑生薑二片煎六分去滓稍熱服乳食前

治小兒吐瀉不止男子婦人大人亦宜服

陳鹽梅

二箇乾木瓜

三錢

食茱萸

二錢

食鹽

二錢

右用鹽炒茱萸水一椀煎至半椀不拘熱服

去桂五苓散

猪苓

白朮

赤茯苓

去皮各五錢

澤瀉

七錢半

右為末用車前草燈心湯下一方加羌活鎮心加棗煎砂吐不止加生薑自然汁渴盛加人參

肉豆蔻丹治小兒泄瀉水穀不消

木香

肉豆蔻

各一兩

青橘皮

半兩炒黃

黑牽牛

一分炒

右為細末滴水如和黍米大每服十粒米飲下食前或入生薑朱飲須量大小加減

建中丹治泄注不止啼腹痛

胡椒

蓬朮

肉豆蔻

各半兩

金蝎

一分

右為細末麪糊為丸黍米大每服十粒米飲下

藿香散治小兒脾胃虛弱乳食不調時作身熱或吐瀉
不定

藿香

人參

白茯苓

各半兩

丁香

一分

右為末每服一錢水半盞煎至三分去滓溫服不拘
時若傷風熱入生薑一片作驚加菴活防風各半兩

痰逆加湯洗半夏一片薑三片煎如前

治百日兒以下羣內吐痢方

麴

一錢
炮

乳汁

二錢
兩龍骨

六分

右為龍骨煎入炒麴服之

中和散治小兒木及周時吐瀉不止因乳母氣血勞動
或熱姦傷胃致有痰涎

雄黃

少許大黃

五靈脂

各等分

右同研為末每服一字磨刀水調下

大白朮散治脾胃氣虛嘔吐泄瀉外熱裡寒手足厥冷
逆昏困嗜卧面色青白下痢清穀不思乳食

甘草

二兩
炮

乾薑

一兩
半炮

附子

一箇去皮生
用分作八片

右為細末每服一錢水六分盞生薑二片同煎至四
分去滓溫服量大小加減

龍骨散治小兒吐利

龍骨

一分

赤石脂

縮砂

去皮各
一兩

右為末麴湯下一字或半錢大人一錢若止吐入丁

香一分代縮砂

桃紅散治小兒脾胃虛弱來冷吐痢不定不問冷熱可服

人參

洗去蘆剉

藿香用葉麴紅色

各二錢半

右為末每服五分米飲下無時量大小加減

治吐利不止

陳鹽梅

二箇乾木瓜

二錢食茱萸

三錢

右用食鹽二錢炒同煎服

三和散治吐利津液燥少

白茯苓

錢一

烏梅肉

炒

乾木瓜

兩

各半

右為細末每服一錢水一小盞煎五分去滓時時溫服之

妙應丸治吐瀉霍亂下利不止

丁香

九四十

杏仁

胡椒

各四十

巴豆

粒七

好硃砂

錢二

右為細末飛羅麪為丸硃砂為衣每服五七丸白湯

下

甘露飲治小兒伏熱吐瀉兼中暑昏迷煩渴不止心慄
體熱頭疼及傷風體熱渴嘔煎

石膏

寒水石

各一兩

甘草

三錢

右為末三歲半錢燈心湯下暑熱冷水下立夏後立
秋前宜用月餘不可一方獨用薑汁調下而止

豆蔻香連丸治洩瀉不分寒熱赤白陰陽不調腸鳴切
痛大效

黃連

三錢炒

肉豆蔻

南木香

各一錢

右為細末粟米飴九米粒大每服米飲下十九至二
三十九日後各四五服食前

小香連丸治冷熱腹痛水穀利滑腸

木香

訶子肉

錢各一

黃連

半兩炒

右為末粟米飯和如小豆大米飲下十九三五十丸
頓服之食前取效為度

白龍丸治小兒吐瀉不定滑洩注水小便少

附子

炮半兩

白石脂

煨

白龍骨

煨各一分

右為末白糊丸小豆大三歲三十九米飲下食前一
方加白礬煨一分除白石脂加滑石

契聖既濟丹治小兒陰盛陽虧臟腑虛寒泄瀉不止

熟硫黃

錢一

白礬

枯二錢

半夏末

二錢

薑汁浸半日乾秤

右為末雪膏丸如麻子大每服三五十九溫米湯下
茱連丸治小兒夏月暴瀉注下

土黃連

吳茱萸

各一兩

陳皮

半兩去白

右為末水煮白麪糊為丸大如麻子每二十九湯飲

下

治白瀉不止

白石脂

錢一

白龍骨

錢一

白茯苓

錢二

右為末滴水丸如粟米大每服二十九紫蘇木瓜湯下乳前三日

神功散治小兒滑腸不止

五倍子

百藥煎

乾薑

炮各等分

右為末每服一錢米飲下大人煮糊丸黍米大每服

三十丸米飲下

治小兒因吐瀉胃虛生風作驚癇狀

天麻

白附子

各一分

白朮

二分蜜炙焦須用木炭火洗淨切焙入蝎梢三

七箇用

右為末朱飲調下一方無天麻

治小兒吐瀉不止

龍骨

火燒存性

滑石

定粉

各等分

右為細末每服一錢至二錢熱水調下

治小兒吐痢

亂髮

半兩燒灰

鹿角

六銖

右為末米汁服一刀圭日三

石黃散治小兒吐瀉

白滑石

硫黃

等分

右為末糯米泔下一字治霍亂吐瀉用滑石一分硫

黃半兩每服半錢

新生小兒未滿月及百日舌上生瘡口中白膏厚如池紙垢子臘脂

兒病用女乳汁女病用兒乳汁同調塗舌上一宿至效

不二九

巴豆

三十箇去心膜細研別用好黃連
半兩水浸紙二張裹豆煨令出油 硃砂末一錢

寒食麪

一錢

右研勻滴水丸如綠豆大以新汲水磨下一丸

木香丸治小兒蕪大人吐痢

木香

白茯苓

等分

右為末煉蜜丸如梧桐大每服二十九生薑米飲下
量兒大小化下三五丸

治小兒吐痢

舶上硫黃 藿香

等分

右為末每服半錢生糯米泔調下

治吐利

丁香 白朮

等分

右為末麴糊丸如粟米大飲下十九至十五丸臨時

增減

治吐瀉

草果子 甘草

右等分半為末米飲下

二聖丸治小兒臟腑或吐瀉不止羸瘦成疳宜常服

川黃連

去須一兩 黃蘗 去粗皮一兩

右為末入猪膽內湯煮熟丸如綠豆大每服二三十

丸米飲下量大小加減頻服

附香丸治小兒吐瀉不退腸鳴腹疼肚急氣粗

附子

炮去皮

木香

炮等分

右為末白麴糊丸如小豆大三歲二十九粒湯下食
前一用附子白茯苓等分不用木香糊丸治用同

香肉丸治小兒吐瀉不定兼咳嗽噫入口便定

木香 肉豆蔻

等分並裹根
令麴焦為度

右糊為丸小豆大白湯下若作末白水煎亦可咳嗽

熱服

雙黃丸治小兒洩瀉注水腸鳴肚疾

黃連

炒 硫黃 等分

右為末白糊丸小豆大三歲十九米湯下食前

半硫丸治小兒洩瀉注下或手足冷者亦治咳嗽

半夏

湯炮七次

硫黃

各一兩一方加蜆白附各半兩

右為末薑汁糊丸小豆大三歲三十九米湯下一方

加白礬半兩名二聖既濟丹

川椒丸治小兒夏月傷濕冷入於腸胃泄瀉不止

川椒

一兩去目用雙者連枚炒

肉豆蔻

炮半兩

右為末粳米飯為丸如小豆大三歲三十九米飲食

前

豆附丸治小兒搐溺吐瀉

肉豆蔻

一個附子一筒炮

右為末麪糊丸粟米大飯飲下

正氣人參膏治小兒脾胃氣處中寒腹痛泄痢嘔逆不
入乳食夜哭睡中多驚吐利蛇蟲虛煩悶亂服之止
煩渴調脾胃進食

人參 乾木瓜

甘草

剉炒各半兩

陳橘紅

罌粟米

乾薑炮 茯苓各一分

右為末煉蜜和膏每服一皂子大米飲化下

梓朴散治小兒吐瀉魚誤食冷藥脾虛成慢驚風涎潮
搐弱大人亦可服去涎去風

梓州厚朴

一兩 細剉 一錢湯洗七次 薑製晒令乾

右以米泔水二升同浸一百刻候水盡為度如水未
盡加火熬乾去厚朴不用只用半夏為末每服半錢
或一字薄荷湯下效

半粟散治小兒脾胃虛寒吐瀉水穀不能入及冷痰

齊州半夏

一兩湯炮七次洗切焙乾

陳粟米

二錢一方用陳梗米三錢

右咬咀每服三錢水一大盞半生薑十片煎至八分去滓食前溫服一方用北棗煎

治小兒吐瀉

以熱牛屎含之一作牛膝

又方

燒牡猪尿水解取汁少服之

治小兒吐利不止

以麝金一個刮開心入去殼巴豆一箇麝裹煨熱取出候冷去麝及巴豆不用只用麝金為末米泔汁調下一字大

治小兒夏秋吐痢

以大好黃連一兩剉碎去須土炒令黃色次入虢丹一兩同黃連炒令丹焦為度搗出放在紙上仍放散着地令冷為末薄煮麝糊為丸如芥子大每服二十

粒至三十粒用壁土生薑煎湯下量大小加減連進
二服尤佳

獨附散治小兒吐瀉氣脫四肢冷肚疼眼慢

以附子一箇炮去皮臍為末三歲一小盞水半盞薑
汁一蜆殼棗半枚煎三分以下水中頓冷飢服

治瀉不止

用椽斗子二箇入黃丹在內合定燒灰存性為末每
服半錢至一錢米飲調下

又方

以訶梨勒皮為末每一錢陳米飲下

半夏湯治小兒吐瀉發搐覺有痰者

以五苓散入生薑半夏煎服吐了痰瀉亦止驚自退
豆蔻散治腹痛洞泄腸鳴胃虛冷乳食不化

肉豆蔻一枚剉一小孔內滴乳香一塊麪裹煨熟為
末每服一錢米飲調下一法用麪糊為丸如黃米
大一歲兒服二三十丸空心日進二服溫米飲送下

椒紅散治小兒水瀉年及五十以上患瀉

用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾為末磁器貯之
每服二錢或酒或米飲下

治小兒熱瀉

用黃蘗削皮焙杵末用薄米飲為丸如粟米大每服
十九米飲下

治小兒瀉

以桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過線繫葉蒂上

繡陰乾細切用水煎汁服之

治小兒暑月泄瀉無度

以雞子五枚同菜豆煮熟令豆軟下陳倉米作稀粥攪令粥溫食就以雞子壓之須喫一二頓乃安

治小兒鼓脹聚瀉

用膽礬二錢半為末乾蒸餅丸麻子大陳皮湯下十
九

鍾乳震靈丹治小兒腎瀉面黎黑齒消脫骨力弱小腹

痛泄多白膿

用震靈丹三九為末入鍾乳粉半錢以炒破故紙一錢半生肉豆蔻一錢大棗二枚煎取清汁乘熱調空心灌下

治梅月天時行瀉

用香葛湯每服生薑二片豆豉五粒水一盞煎服
南星散治小兒吐瀉兼誤食冷物脾虛生風成慢驚
以天南星一箇重八九錢已上者掘地作坑深三寸

用炭火五斤燒通赤入好酒半盞後入南星又用炭火三二條蓋坑上候藥微裂取出再炒為末每服半錢或一字煎生薑防風湯食前調下量兒大小加減治小兒驚瀉不定

以蝎稍七箇胡椒四十九粒為末每服半錢荊芥湯下

白龍丸治小兒瀉清水不止

白石脂

一分

白龍骨

一分

右為末滴水丸如芥子大每服三四十九至五十九
紫蘇木瓜湯下日三量兒大小加減與服

雙金丸治小兒泄瀉不止胃腸痰喘吐逆欲變風證

金液丹 青州白丸子等分

右同研麪糊丸如黍米大每服五十九米飲下痰多
加白丸子瀉多加金液丹可後六神散調之

黃龍丸治小兒中暑吐瀉胃悶煩渴昏迷身熱有痰

半夏

四兩米醋
半升煮乾

白茯苓

甘草

各一兩

右為末生薑汁煮糊丸如小豆大三歲三十九生薑
燈心湯送下即消暑丸

杏仁丸治小兒中暑吐瀉煩渴肚疼亦治痢

川乾葛

二兩
炮

杏仁

二兩半
沙炒

柳桂

去皮生一
兩二錢

甘草

三兩

炒

右為末先研杏仁為粉白糊丸小豆大每三歲三十
丸燈心湯下本大順散因改為丸亦鍊蜜為膏冷水
化下飢服一用車前子為末米湯調下治水瀉尤妙

治吐痢轉筋

用桑葉研水服

木瓜湯

乾木瓜

兩 茴香

二錢 炒

甘草

一分 炙

吳茱萸

五錢 湯 炮 七次

右剉生薑紫蘇煎入鹽服

備急方

取瓦屋上熱瓦熨心下

艾灰餅子治小兒吐瀉日夜無度

艾葉

燒灰
留性

白龍骨

定粉

各三錢

肉豆蔻

一枚麩
裏煨熟

黃

丹

半錢火
煨飛過

右件為細末滴水和丸每一兩作四十九捏作餅子
每服一餅子先用取油燈盞水洗過煎油燈盞湯化
下乳食空

銀白散治小兒吐瀉之後脾胃虛弱昏睡露睛漸生虛
風

人參

去蘆頭

白茯苓

去皮

白朮

山藥

天麻

全蝎

去毒 微炒 白扁豆 炒各一兩 甘草 炙一分

右㕮咀每服二錢水六分盞生薑一片棗一枚同煎至三分去滓溫服乳食前

人參散治腹瀉百藥不痊

人參 白朮 炮黃耆 白茯苓 甘草 炙等分 肉豆

菟一箇 史君子 兩 胡黃連 二分 宣連 二錢 青皮 半兩 去穢 莪

朮 兩

右為末用陳米同煎大小以意加減

六神丸治腹瀉不止

豆蔻

牛兩炮去皮

木香

牛兩炮

丁香

三錢

訶子肉

二錢炮

史君

子

三錢蘆會

牛兩別研

右為末爛飯為丸如黍米大每二十九湯飲下一方

名六神丹定吐瀉薄糊為丸菴豆大粥飲吞下

一捻散治小兒滑泄腹脹作瀉吐逆不思食方

陳皮

青皮

丁香

各一錢

訶子肉

甘草

各一分

右為末米飲調下

前朴散治心腹結氣嘔吐泄瀉肚脹疼或發驚悸

前胡 白朮 人參 陳皮 良薑 藿香 甘

草 厚朴

各一錢

右為散每服三二錢煎熱服

白朮丁香散治小兒吐瀉不止煩渴小便少

人參

二錢

白朮

丁香

豆蔻

各三錢

桂府滑石

二兩 舶

上硫黃

三錢

右為細末大人每服二錢小兒每服一錢溫米飲湯

調下食前

黃連丸治小兒瀉

黃連

去鬚
一兩

南木香

一兩

右二味各一半生一半炒為末醋糊丸如菉豆大每服三二十粒多至五十粒米飲下鄭樞密達夫嘗用有效

車前子散治小兒伏暑吐瀉渴引飲小便不通

白茯苓

木猪苓

各去皮

車前子

人參

去蘆

藿香葉

等分

右為細末每服一錢煎燈心湯下不拘時候

理中丸治吐痢不歇米穀不化手足厥冷

人參

去蘆

白朮

剉

乾薑

炮

甘草

炙剉各一兩

右為末煉蜜和丸雞黃大每服一九水一大盞化開煎及七分連滓放溫服小兒分為三服大小以意加減食前

金液丹治吐痢日久脾胃虛損手足厥逆精神昏睡寒

多睡露睛口鼻氣涼欲成慢驚風者又治大人陽虛陰盛身冷脉細自汗吐瀉小便不禁

舶上硫黃

十兩先飛煉去砂石秤研為細末用砂合子盛令八分滿水和赤石脂封鹽泥

固濟晒乾露地先埋一罐盛水令滿生盒子在上又以鹽泥固濟用火煨令溶候凝取上黃明者用

右以柳木搥乳鉢內研為細末每服二錢生薑米飲調下大小以意加減多服效大人藥末一兩水浸軟飯和九桐子大晒乾每服五十九至百九米飲下并空心連服

又方

硫黃

不以多少淡黃通明為上飛煉去砂石研末用有蓋砂罐子一箇取水中心田字草或益母

草搗極爛成泥更入紙節同搗固濟罐子貴不破晒乾成硫黃末在內可不滿兩指於露地深盡十字放罐子在中心使底下通透四面用炭約四五觔勻火熬不蓋罐子頂用時揭觀候化為汁速去四面火溫土埋一宿次日取出於見日氣處掘一坑子約三尺將罐子去蓋倒埋一宿至次日取出和罐子入湯內五十沸流出取藥

右以柳木槌乳鉢內研如粉麪相似小兒因吐瀉之後變成慢驚者每服一二錢生薑米飲調下餅取效

大陰證傷寒脉微欲絕風以水浸無鹽蒸餅和圓桐
子大晒乾每服五十九或百九

觀音救命散治小兒熱瀉

木香

錢一川連一兩

右以水三椀煮乾去連只以木香乾焙為末分三服
或兩服量兒大小與之加燈草數莖各長四寸棗子
一枚煎湯調下乳食前服

參蘇飲子治小兒伏熱吐瀉虛煩悶亂引飲不止

人參去蘆白朮

白茯苓去皮甘草炙

紫蘇葉 乾木

瓜 香薷葉

厚朴去皮薑製

半夏麴

白扁豆炒 陳

橘紅各等分

右剉散每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時候

八賢散治小兒洩瀉發熱手足稍冷

當歸 白芍藥 白茯苓 甘草各一兩 川芎 桂

柴胡各半兩 熟地黃一兩

右呖咀三歲一錢水半盞煎至三分去滓無時

桃紅散治驚瀉

辰砂

少許

羌活

半兩

防風

半兩

人參

一錢

白朮

三錢

茯苓

錢半

蟬

蛇

三箇

甘草

右為末每服錢半荊芥湯下如未止用天麻四君子湯相間服之為妙

陰陽丸治伏熱吐瀉并諸般吐逆不定

硫黃

半兩

水銀

一錢

右同研無星如黑煤色薑汁糊丸小豆大三歲三
九冷水下

豆蔻散止瀉

豆蔻

一箇
麝煨

青皮 陳皮 木香 白朮 甘草

各一

錢

草果

一箇

右爲末米飲下

調中散治小兒調氣主脾及治吐瀉

人參 白朮 茯苓 甘草 訶子

煨

陳皮 木

瓜

白扁豆

炒

黃耆

蜜炙

木香

罌粟子

炒

乾紫蘇

葉

右等分為細末白湯點服

藿香散治小兒臟腑不調作瀉青黃黑白乳食不消糞
中有凍如雞子清兼暴瀉如水其證肚痛微熱面赤
唇黃白此藥治之慢驚或僵墜紅腫內吊紫蘇湯調
下三五服痛止宜用此藥

陳皮

藿香葉

厚朴

薑製

枳殼

去穢

甘草

右等分爲細末陳米飲下紫蘇湯下糞中有黃白凍
子木瓜并白梅去鹽煎湯下如痢止用棗子煎湯下
大能和胃進乳食此是小兒常服藥

斗門九治小兒腸胃虛弱泄瀉糟粕或變白沫日夜無
度

附子

一枚重六錢
炮去皮臍尖

乾薑

炮各
一分

肉豆蔻

麝
煨熟

右爲細末煮麪糊和丸如黍米大每服三十九溫米
飲送下乳食空

固腸丸治小兒臟寒泄瀉色多青白腹痛可食

硫黃

別研

肉桂

去粗皮

龍骨

別研

訶子

煨去核

丁香

等分

右為細末煮麪糊和丸如黍米大每服三十九溫米飲送下乳食空

調臟丸治小兒臟腑不調泄瀉頻并精神昏困全不入食

木香

人參

去蘆頭

白朮

乾薑

肉豆蔻

麪裹煨熟

白

芍藥

等分

訶子丸治脾胃不和泄瀉不止

訶子

煨去核

乾薑

炮

肉豆蔻

麩裏煨熟

木香

赤石脂

等分

右件為細末煮麩糊和丸如黍米大每服三十九溫

米飲送下乳食前

固腸丸治小兒臟腑泄瀉色多青白腹痛可食

硫黃

二錢別研

牡蠣

煨別研

龍骨

煨別研

乾薑

炮

木香

各一兩

右為細末煮麩糊和丸如黍米大每服三十九溫米

飲送下乳食空

豆蔻丸治小兒風冷搏於腸胃飧泄不止不思飲食

肉豆蔻

麩裹煨熟

草豆蔻

去殼各半兩

草烏頭

三枚燒灰留性

右為細末煮麩糊丸如黍米大每服十九羅蔔湯下

乳食空

治小兒冷瀉欲死者

肉豆蔻

煨

粉草

炙

藿香葉

右三味等分為末陳米飲下一錢

治小兒久瀉不止喫煖藥其瀉愈甚忽喫食減少非時

吐逆喫煖藥其吐愈甚此為腳瘡毒氣刑脾故有斯疾但雖久瀉忽吐唇皮常焦赤色口內常多涎溢生口瘡方熱瘡宜喫此方若是面色青黑唇皮無色不須服此方但小兒體氣虛弱須是審慎方可投藥

山梔

一兩荆芥

三分羌活

獨活

各半兩

薄荷

五錢

右為細末每服一錢食後煎薄荷湯調下去滓服兒大者服一錢半

溫白丸治小兒久瀉脾虛不進飲食食乾仍前瀉下米

穀不化

白朮

一分用米泔浸少時切焙

半夏

一錢半湯炮洗七遍

丁香

半錢炒

右為末生薑自然汁煮麴糊為丸如菉豆大每服半歲三九三五歲五七九淡生薑湯吞下早晚各進一

服

惺惺散治嬰孩小兒久瀉脾困不思食乳恐作脾風

天麻

半錢

全蝎

半錢

糯米

一錢微炒

白扁豆

一錢炒

人參

一錢微炒

茯苓

一錢微炒

木香

一錢炮

山藥

一錢炮

甘草

一錢炙

右為末每服嬰兒一字二三歲半錢用水一藥注或半錢棗子半片煎十數沸服

白朮丸治小兒白瀉

白朮 當歸 芍藥 木香

右等分為末煉蜜丸如菉豆大每服十九至十五丸不拘時候米飲下

單方治小兒久瀉臟腑如雞子黃漸作驚風證滁州趙使君云其女甫週歲忽苦臟腑每所下如雞子黃者

米盆許數日之間幾取至百往漸作驚風證有一士
大夫教以鍾乳服亦可以小兒只用一錢七平復矣
傳方者云他日或作少瘡瘍不足慮兒子清老年三
歲過鎮江時病久瀉危甚用法至一半遂安不生瘡
楊氏醒脾散治吐瀉不止痰作驚風脾困不食

白朮 人參 甘草 陳皮 白茯苓 全蝎

各半

兩半夏麴

朮香

各一分

白附子

四箇炮

南星

一箇炮

陳

倉米

三百粒

右為末每服一錢水半盞薑二片棗半箇煎時時
頻服則吐

醒脾散治小兒吐瀉初定

天南星

沸湯浸洗七遍

右一味為細末一歲兒每服半錢以河水七分盞冬
瓜子七粒同煎至二分溫服不拘時候

守胃散治小兒陰陽不和吐瀉不止預防風證常調脾
胃進乳食

人參 白朮 白茯苓去黑皮 山藥 白扁豆炒乾

葛 南星炮 甘草微炙 藿香葉 防風 天麻

右等分為細末每服一錢水一盞冬瓜子二十粒生薑一片同煎至四分溫服如大瀉不止危急每服沉香肉豆蔻各少許

人參白朮散治小兒嘔吐泄瀉口乾唇燥煩渴引飲小便赤澀並宜服之

白朮去蘆 白茯苓去皮 人參去蘆 木香 藿香葉 乾葛

判各滑石臍白者甘草炙三
半兩六錢

右為末每服二錢百沸湯調下或生薑湯亦可或

咀煎服更妙嘔吐加丁香二錢

肉豆蔻膏治小兒夾驚寒大便清瀉服疾不穩

肉豆蔻二錢人參一錢白朮二錢甘草一錢丁香一錢
見火

木香一錢藿香五
見火

右同為細末煉蜜為丸如雞頭大每服一九米飲下

空心如前服

參蘇飲子治伏熱吐瀉虛煩悶亂飲引不止感暑者

白茯苓 人參 白朮 甘草 紫蘇 木瓜

藿香 厚朴 半夏

各等分

右湯點服空心量與神效

沒石子丸大健小兒脾胃吐瀉不進乳食諸病後虛弱
精神昏慢全不入食嘔吐生痰漸成慢脾候立有神
效不可具述

半夏

半兩用生薑一兩半棗煨烟將半夏每箇切作兩片水半碗同薑煮用白麴一錢重乳鉢內

研作餅子一分 慢火炙熱沒石子一分 枚滑石一分 人參一分 丁香一分 白

礬

一錢 枯

硃砂

一錢 細研

右為末每服半錢煎冬瓜子生薑湯調下如為丸用
水調薄薑汁麪糊為丸子每服三十九量大小加減
服

觀音散

扁豆

炒

白朮

煨

茯苓

人參

炙

神麪

炒

麥芽

炒

香

附子

各等分

右為末空心朱飲調下

霍亂 附論

夫小兒霍亂者由陰陽清濁二氣相干氣亂於腸胃之間故為霍亂也然腸胃怯弱或因解脫為風冷所乘及乳哺不消而成吐瀉或乳母觸冒風冷及飲食生冷等物冷氣入乳令乳變敗兒若飲之亦成吐利是皆觸犯臟腑使清濁之氣相干之所致也挾風而實者體熱頭疼而復吐瀉凡遇此病須暫斷乳食仍以藥調適乳母

先當散乳間風冷之氣宜服香蘇飲夾和霍香正氣散
煎食後捨去宿乳服之逐去寒邪次用理中湯加丁香
木香煎服溫養其乳此先定其大勢然後自合釀乳藥
同兒飲之乃服醒脾散使免生慢驚之疾也楊氏曰陽
隔陰而不降陰霍亂也先心痛則先吐先腹痛則先瀉
心腹俱痛吐利並作所謂賊邪木來勝土也王氏曰小
兒內因脾胃虛弱乳哺停積外因感冒寒暑邪正交爭
証有冷熱之不同藥用溫涼之各異陳無擇曰傷風則

惡風自汗傷寒則惡寒無汗胃溫則冷凝傷暑則熱煩
必以外所因而治之扶救不先立致危殆治法必先止
吐次則隨證治利許仁則曰濕霍亂死者少乾霍亂死
者多楊氏曰足陽明屬胃以養宗筋暴吐暴痢津液驟
亡失其所養甚則轉筋入腹而死王氏曰小兒吐痢暴
作最為急證蓋脾虛則吐胃虛則瀉脾胃俱虛吐痢俱
不止吐而不止瀉者危楊氏曰吐瀉不止必轉慢驚慢
脾虛風也又曰小兒有中霍亂吐瀉候上吐下瀉偏身

微熱不能乳哺此因喫食熱不調順脾家受熱胃冷不
消化所致宜用睡驚沉香飲夾丁香散乳香散活脾散
與服如傳變大渴不食面臉紅眼微視氣小不語汗多
恐患慢脾風死候不治又小兒霍亂而成吐瀉仍須進
大七寶散二三服并觀音散二三服溫白丸二三服如
不退恐脾困不進乳食須進惺惺散二三服如此不效
往往變作慢脾風慢驚風此候宜進竹瀝膏二三服間
惺惺散調胃氣並沉香散又小兒霍亂吐痢由陰陽不

和清濁相干與大人無異如救火拯溺宜速療之兼宜
用聖石丹宜順正湯霍亂吐瀉形候忽然吐瀉謂之霍
亂吐瀉如有渴即下沉香飲子夾平胃丸若未有渴量
大小下鮓湯丸通一二遍白涎只依前用沉香飲子平
理胃如尚猖狂煩躁夜睡不得喘息急促此死候不
治翰林待詔楊大鄴問小兒霍亂吐瀉者為何答曰凡
將息小兒之道切慎擇妳母精神強健祥慢智慧深
速身無疾病肌肉肥潤溫厚善能調理
乳食何疾更生衆疾易愈

方

大七寶方治小兒霍亂吐瀉不進食乳

木香

炮

丁香

炒

官桂

不見火

茯苓

麻黃

去節

當歸

甘草

炙

人參

大腹皮

川棟子

去核

阿膠

炒各一錢

訶

子

去核一錢

肉豆蔻

一个

藿香葉

一錢

地榆

炒二錢

右為末每服一歲兒一字二三歲半錢四五歲一錢

水一藥注或半銀盞入棗子半片煎十數沸溫服

地黃散治小兒脾胃氣衰弱霍亂吐瀉嘔逆不食煩躁

迷悶

乾地黄 厚朴去粗皮薑汁浸炒 人參 茯苓 乾葛

藿香葉 黃耆蜜炒 白朮麩炒各一分 丁香 訶子炮取肉各

錢一

右為末每服半錢或一錢用蒼朮煮飯飲調下並進

四五服

肉豆蔻散治小兒霍亂吐瀉不止飲食不下

肉豆蔻一枝去殼 丁香 黃耆剉 枇杷葉去毛炙微黃各半分

桂心 人參 甘草 白茯苓各半兩 陳橘皮一分湯浸

去白

瓢焙

右為散一歲兒霍亂每服以溫水調下半錢大小加

減

半夏散治小兒霍亂後吐瀉不止煩悶

半夏

湯浸七遍去滑用

黃連

去鬚

乾薑

炮製對

陳橘皮

去白瓢湯浸焙

人參

去蘆頭

當歸

微剉炒以上各半兩

黃芩

甘草

炙赤微剉各一分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不拘時

量大小溫服

丁香散治小兒霍亂吐瀉不定

丁香

木香

甘草

炙微赤到

葛根

到

枇杷葉

去毛炙微黃各

半分藿香

人參

去蘆頭

桑黃

各半兩

右為末不計時以麝香湯調下半錢量大小以意加

減服之

救生丹治小兒心膈伏熱生涎霍亂躁悶身熱吐逆惡

心乳食不下

大洩

一錢半

輕粉

三字

乳香

丁香

各半錢

龍腦

一字粉

霜

字三水銀

黃蠟

各二錢

黑鉛

一錢一字與水銀結砂子

右為末鎔蠟為丸如小豆大一歲一丸木瓜甘草湯
饑服如煩躁研生芝蔴馬齒莧水下如逆吐煎藿香
湯下更量虛實加減食後臨卧服之此藥除熱化涎
下膈止吐逆若胃虛傷冷嘔吐不止者不可服凡小
兒吐逆宜速療之久不止遂為慢驚常宜收此藥備
急

醒脾散

人參

半兩
去蘆

丁香

四十粒

白茯苓

半兩

藿香葉

半兩

白朮

半兩

甘草

半兩
炙

天南星

二箇重八錢已上者

縮砂仁

四十枚同
南星炮

右為末生薑冬瓜子煎大小以意加減服

勻氣散治霍亂吐

方見本
門痢類

蘆薈丸治霍亂後乾噦不常

蘆薈

安息香

胡黃連

枳殼

麩炒各
一錢

史君子

三七
箇炒

蕪荑

一分

定粉

一錢

麝香

少許

右為末獐猪膽糊丸如梧桐子大五七丸米飲吞下

麥門冬散治小兒霍亂不下乳食

麥門冬

一兩去心焙

白茯苓

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白

穠焙

乾木瓜

各一分

厚朴

去粗皮塗薑汁炙令香熟

茺香

各半兩

右為粗散每服一錢水一盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候量大小加減服

沉香散定霍亂治吐止瀉補虛調胃氣進乳食

沉香

茯苓

各一分

甘草

炙

丁香

炒

藿香葉

各一錢

木

香

官桂

去粗皮不見火各半錢

右為末每服一歲兒一字二三歲半錢五七歲一錢
以意加減紫蘇木瓜湯調下一日三服

順正湯順陰陽治霍亂吐痢

白豆蔻

高良薑

炮微

藿香葉

當歸

湯浸焙乾

草豆蔻

麩裏炮

陳橘皮

去白炮乾各半兩

丁香

一兩

右為細末每服半錢至一錢溫粥飲調下

順氣散治霍亂吐瀉

人參

藿香

丁香

各一分

茯苓

乾葛

甘草

天台烏藥

各半兩

紅橘皮

一兩

右為末每服半錢水六分棗二枚薑一片同煎溫服

交泰散治霍亂吐瀉

藿香葉 陳皮 肉豆蔻生 半夏製 青皮 酸木

瓜

甘草

微炙各半兩

石菖蒲

二錢

右細剉每服一錢薑三片紫蘇三葉水煎服暑月加

香薷

人參藿香散治小兒霍亂吐瀉不止身熱頭痛

方見本門吐痢

類

治小兒霍亂吐瀉不止心神煩渴方

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白瓤焙各半兩

麥門冬

去心焙

訶梨

勒皮

微煨

丁香

桂心

各一分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時

量大小以意加減溫服

立効方治小兒霍亂不止和胃氣定吐瀉

胡椒

七枚拍碎

人參

去蘆頭

生薑

各半兩

陳橘皮

一分湯浸去白穢焙

紅梗米

四十粒
三枚

右細剉和勻分作七服每服水一小盞煎至五分去滓不計時量大小以意加減溫服

理中丸治小兒或大人冷熱不調霍亂吐痢宿食不消

人參 白朮

甘草

炙

高良薑

各六分

乾薑

桂心

各六分

右搗篩蜜丸如梧桐子大小兒以意加減大人三十丸漸加至四十丸空服以飲服忌生冷油膩生蔥海

藻松萊桃李雀肉等物

人參散治小兒霍亂吐逆不止

方見本門吐痢類

治小兒霍亂空吐不痢方

人參

六分生薑

四分

厚朴

二分

橘皮

一分

兔骨

一兩
炙碎

右切以水一升二合煎取四合服即利下部又以杏

仁鹽少許皂角末少許麩和硬搜如棗核大以線裹

納之便通妳母忌熱麩大效

沉香飲治小兒吐衄霍亂睡驚

沉香 丁香

各一分

檳榔

甘草

炙各半兩

肉豆蔻

一分

右為末每服半錢或一錢用棗子半箇水五分盞煎

二分通口服

銀白散取積取蟲後生胃氣使不霍亂吐瀉脾胃虛弱及治煩渴口乾泄瀉不利內亡津液發渴不止並宜服之

人參 茯苓

甘草

炙

白扁豆

去皮

白朮

炒

右各等分為末每服一錢紫蘇湯調下一方有藿香

葉各加減四君子湯白湯調下或為呿咀每服三錢
水煎服之亦妙

人參散治霍亂候嘔逆不止心胃虛熱

人參 陳皮 桔梗 甘草 白芷

炙二錢

右為末每服一錢水五分入淡竹葉煎二分入蘆荻
根煎亦得

治小兒霍亂吐痢不止方

人乳汁

合二生薑

汁粟米許

蘆荻

一小把

龍骨

六

豆豉

取仁碎以

蒼麥大

二七枚

右以乳煎取一合着少許牛黃麝香兔毛灰等和為
三服如渴以糯米着蜜與食即瘥

人參白朮湯治小兒霍亂吐痢

人參

分六

白朮

茯苓

各四分

厚朴

甘草

炙各三分

右切以水一升半煮取六合分溫服立效嬰孺治期

歲兒

丁香丸治小兒霍亂吐瀉心煩悶

丁香 地黃花 桑葉 硃砂 細研各一分 甘草 半兩炙

赤劉

右為末朱砂令勻煉蜜和丸如黍米大每服二丸以生薑溫湯下三歲以上以意加之

二薑湯清濁治霍亂吐利

高良薑 川芎薑 各一分 丁香 人參 去蘆頭各半兩 甘草

炙一分

右為細末每服半錢米飲調下

建脾膏治一切霍亂吐利皆服之

丁香 藿香葉

人參

去蘆頭
各一兩

沉香

木香

各半兩

右為末煉蜜丸雞頭大每服一粒粟米飲化下

治霍亂吐瀉轉筋方

硫黃 煇硝

晉礬

滑石

細研

白麴

各一兩

右以麴和藥研勻滴水丸如梧子大每服三四十丸
熱水下小兒別作一等丸量大小加減

大薑煎丸治小兒脾胃伏寒吐利不止霍亂煩悶身體

痛發熱嗜卧手足厥逆

乾薑

二人兩

人參

白朮

甘草

各一兩

黑附子

半兩

右為末煉蜜和丸如一兩作八十丸白湯六盞分
化破再煎至四分連滓溫服

順二散治伏熱中暑霍亂吐瀉煩悶躁渴小便赤澀
便血肚疼

木猪苓

去皮

澤瀉

茯苓

白朮

甘草

各一兩

桂

一兩

半乾葛

半兩炒

杏仁

一兩去皮尖雙仁炒

右為末每服半錢至一錢新汲井水調臍臟虛怯
水煎服

六和湯治中暑霍亂吐瀉煩渴

人參 縮砂仁 甘草 杏仁 半夏
去皮 湯炮各一兩 扁

豆 赤茯苓
蘆製 去皮 木瓜
春二兩 香薷葉 厚

朴
薑製各四兩

右剉薑棗煎溫服一方為末每服二錢水一盞生薑
二片木瓜一片煎溫服不拘時

人參藿香散治小兒霍亂吐利身熱頭疼

藿香

半兩

人參

七錢半

白朮

甘草

厚朴

各半兩

葛根

二錢

半

右為末每服二錢水半盞薑一片棗二枚煎三分服

縮脾飲

縮砂仁

三兩

草果仁

烏梅肉

白扁豆

薑製炒

香薷

各一兩

甘草

炙五分

乾葛

一兩

右剉薑水煎服

香豆散治霍亂煩渴

一名人參豆蔻散

藿香葉

肉豆蔻

各一兩

白扁豆

人參

去蘆頭各半兩

甘

草一分

右為末每服一錢水八分生薑二片煎四分溫服

香參膏治霍亂吐瀉不住者

人參

一指大粒

丁香

十四粒

藿香

一錢糯米

七十粒同丁香炒令黃

右為末用棗和丸每服一指頭大溫湯下

丁香散治霍亂吐不食

丁香

二十箇

母丁香

一箇藿香

一錢半夏

五箇湯炮七次

右為末以薑汁浸三宿焙乾為末每服一字藿香湯

下

治小兒霍亂吐利

人參

一兩厚朴

甘草

各半兩

白朮

十八銖

右㕮咀以水一升二合煮取半升六十日兒一合百日

兒三服期年二服間隔乳服之乳母忌生冷油膩等

物一方加乾薑一分或生薑三分

治小兒霍亂方

人參

蘆薈

各半兩
一用根

扁豆

勝二

倉米

撮

右以咀水二升煮取八合溫服

菖蒲散治小兒霍亂吐瀉不止煩悶

菖蒲

肉豆蔻

去殼

人參

去頭

白茯苓

各一分

右為散不計時以溫薑湯下半錢量大小加減

人參散治小兒霍亂吐瀉不定

人參

去頭

陳橘皮

湯浸去白

黃連

去頭

厚朴

去粗皮薑汁炙令香

熟

右各三分為散以陳粟米粥飲調下半錢三歲以上

加服

香連散分清濁定霍亂吐利

木香

川黃連

去頭各一兩

人參

去蘆頭

厚朴

去粗皮塗薑汁炙令

香熟各半兩

右為末每服一錢粟米飲下

快膈散定霍亂吐利服藥多吐即服此藥

甘草

半兩
炙

高良薑

微
炮

肉豆蔻

去
殼

丁香

各二
錢

右為末每服半錢新冷水調下

桃仁膏治霍亂吐瀉

桃仁

杏仁

巴豆

各一
粒

朱砂

少
許

右同研飯為丸如米大每服一丸以飲吞下

治霍亂吐瀉不止方

乾薑

炮

人參

白朮

各四
錢

厚朴

二分薑
汁浸炙

右剉細分作四服每服水二盞煎取六分以意加減

與服入甘草二分尤佳

青金丹治小兒霍亂吐逆及治大人虛實冷熱吐瀉并

諸般吐逆不定

一名陰陽丸

水銀

一錢 硫黃

二錢生者同水銀研令水銀不見星只作黑色

右薑汁糊丸麻子大每服二十九丸淡薑湯下治吐水

調末服

治霍亂常用妙方

南沒石子 肉豆蔻 訶子

右三味各磨水少許煎數沸一二服可止若加黃連
木香等分為末麴糊丸便是沒石子丸亦治熱瀉久
痢

治霍亂吐瀉面色青四肢冷虛汗出方

香薷

一分生薑大棗

薄荷葉

半

右以水一小盞煎至五分去滓量兒大小加減溫服

丁香散治霍亂吐瀉

丁香

錢一藿香

兩枇杷葉

七片湯洗炮

去毛炙為末

右為細末每服一字或半錢飯飲調下只兩服住

治小兒霍亂吐瀉方

草豆蔻 檳榔 甘草

等分

右為末薑煎一分空心服

木香散治霍亂吐瀉

木香 人參

細剉

藿香

各等分

右為末每服一錢水五分煎至三分服

藿香散治小兒霍亂吐瀉

藿香

香薷

末各一分

白茯苓

末二錢

右研每服半錢薑湯下如人行三五里進一服連進

三服

乳香丸治小兒霍亂吐瀉不定

乳香

硃砂

各一錢研

半夏

半兩湯浸洗七次薑汁炒黃

右為末麴糊丸如菉豆大每服五丸米飲下日三服
氏家傳方同半夏却只用一兩名香砂丸

又方

丁香

末一錢

消梨

一枚絞汁

妳汁

一合

右和勻少少與兒服之

又方

甘草

半兩炙微赤剉

肉豆蔻

去殼

乾薑

炮裂剉各一分

右為散以冷水調下一字二歲以上加服

龍骨散治小兒霍亂吐瀉不止

龍骨

末一分

草豆蔻

末半兩

爛蘆蓆

末半分

右研勻以妳汁三合煎二合去滓別入麝香牛黃兔

毛灰各一字生薑汁少許調勻分為三服如人行五里一服

治霍亂吐瀉并冷瀉欲死

肉豆蔻

去殼

甘草

炙微

藿香

各一分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時大小分減溫服一方用粉草

香薷散治小兒霍亂吐瀉體熱煩躁昏冒多渴陰陽不順清濁相干

厚朴

去皮製

黃連

二味同薑汁
杆炒作紫色

香薷

各一兩

右為末三歲一錢水半盞酒少許煎三分去滓水中

頓冷服一方用白扁豆炒各等分

又方治小兒霍亂立驗

人參

一兩

木瓜

一枚

倉米

一撮

右咬咀以水煮分服更量大小加減佳

溫中丸治小兒胃寒泄瀉腹痛腸鳴吐酸水不思食霍

亂吐瀉

人參

切去蘆頭

甘草

炮

白朮

各一兩為末

右薑汁麴糊九菜豆大米飲下一二十九無時

治小兒霍亂但痢不吐方

烏牛糞

半兩燒灰

人參

三分去蘆頭

生薑

半分切

右用甜淡漿水一大盞煎至五分去滓不拘時量大

小加減溫服如渴取曲蟾糞爛龍骨一兩漿水煎服

一作烏牛施草用一團施舒移切

治小兒霍亂方

生薑

四分切

香薷

薄荷

各一兩

右以水煎分溫兒與妳母同服之甚良量兒大小分減稍熱頻服

和中散治陰陽不調清濁相干霍亂吐痢壯熱煩渴胃膈痞悶腹脹滿面色青白手足厥寒困頓多睡全不思食

乾薑

厚朴

去皮薑製

甘草

炙各一兩

右為細末每服一大錢水八分薑生薑三片同煎至

三分去滓溫服

丁香散治小兒霍亂不欲乳食

丁香

一分
人參半兩
去頭

右為散每服水一盞煎五分去滓不拘量大小分減
溫服一方以乳汁三合同煎

肉豆蔻散治小兒霍亂不止

肉豆蔻

一分
去殼
藿香半兩

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不拘

時量大小分減服

治小兒霍亂方

扁豆莖

一升先炙
令黃切細

人參

三兩
切

右以水三大升半取汁煮粟米少許為粥與乳母服
衣裹乳勿令露之每欲乳兒先捻去少許然後乳兒

常服大佳

石黃散治霍亂吐瀉不止

方見本門
吐痢類

治伏暑霍亂吐瀉

胡椒

半兩

豆粉

一兩

右為末煎燈心木瓜湯調下

又方治小兒霍亂吐痢

一名霜葉散

乾桑葉 藿香

各半兩

右為末不拘時以粥飲調下半錢量大小加減

又方

桂心 甘草

等分

右粗末水煎入法醋少許服

治小兒惡氣霍亂方

用梳篦垢水和飲之

治小兒乳霍亂方

取廁屋戶簾燒灰研飲服一錢

又方

用訶梨勒一枚先煎沸湯研一半許與兒服立佳如未止再服

治百日以來及蓐內兒霍亂方

以人乳半合及生薑汁少許和煎服入口定

治小兒熱霍亂諸藥不瘥者

用蘆葉二大兩或蘆根糯米三大合水三升先煮葉
入米煮取一升入蜜少許和服瘥不止即取桑葉二
升生薑半兩切以水二升煮取一升入一匙白米為
飲服

牛泄方治小兒霍亂腹脹不得痢

取牛泄絞汁百日兒一合二百日一合半三歲二合

服

治小兒霍亂吐乳不止

以人參煎湯服瘥

又方

取薄荷葉未乾者研汁量多少捻鼻合口開灌之

治霍亂

用陳大蓼濃煎湯洗足止并服濃汁一二合自愈

時蘿丸治小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下及脇痛

以蒔蘿為末糊丸如菽豆大三歲三十九青皮湯下

治小兒霍亂

以尿滓乳上服之

又方

以牛涎灌口中一合瘥

治小兒吐痢霍亂

用寡婦薦取二十七莖煮飲之

又方

用芹葉細切煮熟汁任性飲多少止

又方

用桑蟲一枚炙焦黃細研以妳汁調灌之

又方

用蠟螬窠微火炙為末以乳汁調一字服之

備用方治小兒霍亂吐痢

用生蒜研塗心下及兩足心効

八白飲治小兒脾虛胃弱腸有風痰水穀入口悉皆

嘔噦體羸氣乏飲食不下霍亂吐痢神情恍惚心胸
脹滿中腕不和

沉香 藿香葉 人參 草果 半夏麴 白川

薑炮 白芍藥 白檳榔 白豆蔻 白茯苓 白

朮 白扁豆炮 白芷各等分

右為末瀉後復吐或吐後復瀉每服一錢水一小盞
生薑二片棗半箇煎三五沸通口不拘時服

五苓散治霍亂吐瀉燥渴飲水小便不利

澤瀉

二兩半剉

木猪苓

去皮剉一兩半

官桂

去皮一兩

白茯苓

剉一兩半

白朮

剉一兩半

右為細末每服一錢溫湯調下渴躁新水調服以意

加減不以時服

丁香散治霍亂

丁香

藿香

各一兩

人參

半兩

右為細末每服一錢以水半盞煎五沸更入妳汁少許去滓稍熱細呷頻服量兒大小加減

乾霍亂

附論

夫乾霍亂者由脾胃氣實陰陽氣內積外傷邪熱之氣搏於脾胃稽留散傷動陽經遂致精神昏亂則血脉不榮易受風冷卒被所感便即心痛煩滿氣粗腹大如鼓涎壅咽乾因其氣虛而邪氣勝邪氣既勝則與衛氣並行其所以不吐痢也蓋脾胃充實難於吐痢其證心神煩亂恍惚多驚故曰乾霍亂也又云忽然心腹脹滿絞痛欲吐不吐欲痢不痢痰壅腹脹頃刻之間便致

悶絕此乃所傷之物因吐痢盡則生若上不得吐下不得痢所傷之物壅閉正氣闕隔陰陽操擾喘脹霍亂氣息少者危法宜蘇感丸疎利之

方

治小兒霍亂不吐痢肚脹奶滿上下不通

甘草

四分

當歸

三分

石鹽

三分

右以水漿一升半煎至六合去滓入牛黃麝香各半錢研蜜半匙相和以下灌之即通奶母與漿水粥飲

勿喫麪肉等

立應散治小兒乾霍亂不吐不瀉腹脹如鼓心胸痰壅

鹽二兩
生薑一兩

右同炒令轉色三歲半錢童子小便半盞煎三分去滓溫服

保安丸治小兒乾霍亂不吐不痢煩悶不知所為

以巴豆一枚去皮心分作十小丸每服一九水研服當快利三五行即以漿水補之

治乾霍亂

以蘇合香丸加枳殼一分木瓜半分煎湯調下

又方

以炒鹽二椀紙裹綃護頓胸前并腹上截以熨斗火熨令熱氣透即蘇又炒鹽依法熨背則全愈一方用鹽一大盞極鹹熱飲以手剉喉令吐三飲三剉三吐即止

治小兒乾霍亂渴熱及壯熱眼色慢四大困悶

以烏豆二升淨洗乾擇生薑一兩切水三升煎豆皮
欲爛即濾取汁二合和少許蜜喫即便吐如人行五
七里又與喫無問大小兒並令服之效

霍亂心腹痛

附論

夫小兒冷熱不調乳哺不節使陰陽二氣相干而變亂
於腸胃則成霍亂也心腹痛者是冷氣與真氣相擊或
上攻心或下攻腹故成痛也

方

人參散治小兒霍亂心腹痛不欲飲食

人參

去蘆頭

白朮

芍藥

草豆蔻

去皮

厚朴

去粗皮塗薑汁

炙令香熟

當歸

剉微炒

陳橘皮

浸去白瓤焙

丁香

桂心

各一分

右為細散不拘時煮薑棗米飲調下半錢量大小加

減

治小兒霍亂心腹刺痛吐利方

茯苓

桔梗

人參

各六分

白朮

五分

甘草

炙四分

厚朴

炙四分

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時
量大小加減溫服

人參散治小兒霍亂心腹痛不欲飲食

人參

一分去蘆頭

丁香

一分桂心一分

白朮

三分芍藥三分

右為散不拘時煮薑棗米飲下半錢量大小加減服
肉豆蔻散治小兒霍亂吐瀉不止腹痛

肉豆蔻

去殼桂心各一分

人參

去蘆頭

甘草

炙微赤剉各半兩

右為散每服一錢水一小盞生薑少許煎至五分去

滓不計時量大小加減溫服

烏藥散治小兒乳食冷熱不和及心腹痛或水瀉乳汁

不好

香附子

用白者

高良薑

赤芍藥

天台烏藥

等分

右為末每服水一盞煎六分溫服如心腹痛入酒煎

米飲下不計時

調中丸

甘草

半兩炒

白朮

半兩

人參

切去鬚半兩

乾薑

四錢炮

右為細末蜜丸如菉豆大每服半丸至三二十九食
前溫水送下

治轉筋入腹欲死

用生薑一兩槌碎酒五盞煮服

又方

令病人仰睡熱土頓臍上令人尿之

針頭丸治小兒霍亂吐瀉腹中疼痛

巴豆肉

二箇水半盞煮乾

阿魏

雞頭大一塊


舶上硫黃

如魏大

右研勻以薄糊搜作餅子如錢眼大每服一餅子針頭穿定燈上燒留三分性淡薑湯化開服

治霍亂吐痢腹痛

用高良薑水煎加粳米如粥食之



普濟方卷三百九十五